

# LA PREASPIRAZIONE DELLE OCCLUSIVE SORDE GEMINATE NEL SENESE

*John Hajek, Mary Stevens*

School of Languages, University of Melbourne

## RIASSUNTO

L'aspirazione si ha spesso dopo il rilascio della chiusura delle occlusive sorde ed è un fenomeno assai diffuso fra le lingue del mondo. Meno comune è la preaspirazione che si può avere prima della chiusura consonantica. La preaspirazione è tipica delle occlusive sorde di una vasta zona scandinava, ma finora non è stata osservata in Romània. Una dettagliata analisi acustica ha rivelato per la prima volta una notevole preaspirazione delle occlusive sorde geminate di un dialetto romanzo, per es. /fatto/ [fahto] ~ [fatto] nel senese. In questa sede riportiamo i risultati del nostro studio su alcuni aspetti della preaspirazione nel senese nei contesti seguenti: /Vpp/, /Vtt/ e /Vkk/. A questo punto possiamo dire che la preaspirazione si nota nella pronuncia di tutt'e 6 i soggetti (3 mm., 3ff.) del nostro campione. Però, vorremmo anche sapere se la preaspirazione è condizionata dall'identità dell'occlusiva sorda e se dovrebbe essere considerata un correlato fonetico dell'accento tonico, come lo è in alcune lingue scandinave. Inoltre, investighiamo fino a che punto la preaspirazione interagisce con la durata segmentale sia della vocale che della consonante sorda geminata.